

Itomed® 50 mg Filmdoubletten

Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Filmdoublette enthält 50 mg Itopridhydrochlorid. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Filmdoublette enthält 70,95 mg Lactose (als Lactose-Monohydrat). Sonstige Bestandteile: Doublettenkern: Lactose-Monohydrat, Vorverkleisterte Maisstärke, Croscarmellose-Natrium, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat; Doublettenüberzug Opadry II Weiß 85F18422 (teilweise hydrolysiertes Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Macrogol 3350, Talkum). **Anwendungsgebiete:** Behandlung von gastrointestinalen Symptomen der funktionellen Dyspepsie, verursacht durch verringerte gastrointestinale Motilität. Das Arzneimittel ist für Erwachsene bestimmt. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Itomed darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine erhöhte gastrointestinale Motilität gesundheitsschädlich sein kann, z. B. bei Patienten mit gastrointestinalen Blutungen, mechanischer Obstruktion oder Perforation. **ATC Code:** A03FA07. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Zulassungsinhaber:** PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. **Stand der Information:** 10/2023
2024_002